

17n (15)

EVOLUCION APE RICARDO RIVADENEIRA MONREAL.

- 25 Jun. 91: 2,54
- 10 Ag. 93: 4,60
- 18 Dic. 96: 2,73
- 25 Jun. 97: 4,13

Julio 97: Operación. Turf. Biopsia (BPH)

- 14 Ag. 98: 3,63
- 6 Oct.99: 4,77
- 10 Nov. 99: 4,65
- 14 En. 00: 3,88
- 13 Sep. 00: 4,14
- 19 May. 01: 4,45 Libre: 0,53
Libre/ total : % 12

Antibiótico: Cipro.

- 12 Jun. 01: 0,72 Libre: 0,29
Libre/total: % 40,7
- 29 Nov .01 5,93 Libre: 0,76

Biopsia. Emisión: 24 Dic. 01. "Sin evidencia de neoplasia. Prostatitis crónica inespecífica". Dr. Ignacio Wisyuba.

- 15 May. 02: 9,09 Libre: 0,92
Libre/total: % 10,7

Biopsia con anestesia total: 2 Jul. 02. "15 fragmentos filiformes de tejido blanquecino de 1 a 2 cms. Tejido prostático (90 mm.) Sin evidencia de neoplasia. La muestra se estudió con cortes seriados". Dra. Marcela Shultz-

- 11 Dic. 02: 26,05 Libre: 2,07
Libre/total: % 7,9
- 22 Dic. 02: 25 En EE.UU.

Biopsia en EE.UU, 24 Dic. 02: Lado derecho: prostatitis crónica. Lado izquierdo: Adenocarcinoma prostático. Gleason 7 (4,3).

30 Dic. 02: Primer scanner de huesos en Chile. Con igual fecha scanner de abdomen y torax.

Desde el 27 de En. 03 y el 28 de Mar. 03: Radiación en EE.UU. Presbyterian Hospital, Dr. Nori. 8,100 cGy. Técnica IMRT. Por encargo de Dr. Darracott Vaughan, de la Universidad de Cornell, N.Y.

- 21 Mar. 03: 23 (en EE.UU)
- 30 Jun. 03: 48,04

Del 1 al 14 de Jun. 03: Doxiciclina 100 mg cada 12 hs.

- 16 Jul. 03: 68,81

Del 16 al 26 de Jul. 03: Flutamida 250 mg cada 8 hs.

22 Jul. 03: Segundo Scanner de huesos en Chile.

26 Jul. 03: Inyección de Decapeptil 11,5 mg.

Del 26 de Jul. al 5 de Ag. 03: Cipro 500 mg. y Doxiciclina 100 mg. cada 12 hs.

- 11 Sep. 03: 19,79

15 Set. 03: Tercer Scanner de huesos en Chile.

"Actividad osteoblástica alterada, compatible con localizaciones secundarias".

- 2 Oct. 03: 15 (en EE.UU.)

2 Oct. 03: Scanner de huesos en EE.UU. "Etiología incierta, sin embargo, no se excluyen metástasis"

10 Oct. 03: inyección de Lupron, 30 mg., cuatro meses en EE.UU.

- 10 Nov. 03: 6,63 (en Chile)
- 12 Ene. 04: 1,72

1º Feb. 04: Lupron 11,25, tres meses, en Chile.

- 12 Mar. 04: 1,01

15 Mar. 04: Cuarto Scanner de huesos: actividad disminuída.

- 31 May. 04: 1,14

- 30 Jul. 04: 1,65

3 Ag. 04: Lupron 11,25, tres meses, y Flutamida 250 mg. , 3 veces al día, por tres meses.

2 Nov. 04: 0,02.

3 Nov. 04: se suspende Flutamida y se inyecta Lupron 11,25, tres meses.

12 Ene. 05: 0,14

12 Ene. 05, Quinto Scanner de huesos: sin actividad.

3 Feb 04: se vuelve a Flutamida por tres meses y se inyecta Lupron 11,25 tres meses.

28 Mar. 05: 0,03

17 Mayo 05: 0,02

18 Mayo 05: se suspende flutamida y se prescribe Lupron 11,25 tres meses a partir del 18 Agosto 05.

8 Ag. 05: se inyecta Lupron 11,25 tres meses.

5 Oct. 05: